

۳ هدیه
رایگان

کتاب ۱۰ جهش

دوره تندخوانی

سه بعد موفقیت در کنکور

۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴

کاملاً رایگان
از ما هدیه
بگیرید.

۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴



مهدی براتی

نویسنده کتاب ۱۰ جهش طلایی تارته ۱۰۰
۱۸ سال تجربه تخصصی مشاوره تحصیلی
سرگروه توسعه شایستگی استان خوزستان
مشاور صدها رتبه برتر در کنکور

برای دریافت کلمه ۱۰ جهش را پیامک کنید

کانال تلگرام و شاد: mehdibaratimoshaver

مهدی براتی معمار ذهن رتبه ساز ۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴

۳ هدیه بی نظیر را به صورت کاملاً

رایگان از ما بگیرید.

چاپ دوم

۱۰ جهش طلایی

تا رتبه ۱۰۰

خودآموز برنامه ریزی در یک ساعت
انتخاب های سرنوشت ساز
مطالعه صحیح، هنر است
کمتر بخوانید، بیشتر تست بزنید
خدا حافظی با فراموشی
همیشه با انگیزه باشید
شبانه روز ۲۸ ساعت است!
چگونه تند خوان شوید
راز داشتن ذهن قدرتمند و بدون دغدغه
تمرکز بودا، حافظه اینشتین

به همراه
۱۹۹ هزار تومان
هدیه

مهدی براتی

۱- کتاب ۱۰ جهش طلایی تا رتبه ۱۰۰

توجه: کاملاً رایگان

۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴

www.moshaversubz.com

تند خوانی ویژه ی کنکور

چگونه در سال کنکور در سریع ترین زمان تندخوان شویم؟

مدرس: مهدی براتی
ویژه ی دانش آموزان
دانشجویان و مشاوران

۳- دوره تندخوانی ویژه کنکور

دوره ۳ بعد موفقیت در کنکور

- ✓ اصول مطالعه
(روش مطالعه و بودجه بندی و اهمیت هر درس ۱۳ قسمت)
- ✓ مهارت های مطالعه
(اصول تست زنی، آزمون دادن، خلاصه نویسی و ... ۱۴ قسمت)
- ✓ روانشناسی مطالعه
(مدیریت ذهن، کنترل استرس، تبیلی، افزایش عزت نفس و خودشناسی و ... ۲۶ قسمت)

مدرس: مهدی براتی
موزه، دانش، آهنگ

۲- سه بعد موفقیت در کنکور

به کانال ما در شاد و یا تلگرام بپیوندید .



[@mehdibaratimoshaver](https://www.instagram.com/mehdibaratimoshaver)

مرجع دانلود سوالات مفهومی ویژه نمره ۲۰ نهایی از سرگروه های درسی

۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴

سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک ۳	رشته: علوم تجربی	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲	تعداد صفحه: ۴	نام و نام خانوادگی:	ساعت شروع: ۸ صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۲		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir	

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می باشد.

ردیف	سؤالات	نمره
۱	واژه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در پاسخنامه بنویسید. الف) جهت بردار شتاب متوسط همواره در جهت بردار (تغییر سرعت - سرعت) است. ب) نسبت مسافت طی شده به مدت زمان حرکت (سرعت متوسط - تندی متوسط) نامیده می شود. پ) نیروهای وارد بر یک کشتی در حال حرکت، متوازن اند. در این صورت کشتی با (سرعت - شتاب) ثابت حرکت می کند. ت) جرم زمین تقریباً ۸۰ برابر جرم ماه است. نیروی گرانشی زمین بر ماه (برابر - نابرابر) با نیروی گرانشی ماه بر زمین است. ث) چتربازی اندکی پس از یک پرش آزاد، چترش را باز می کند، و پس از مدتی به تندی حدی خود می رسد. در این حالت نیروی مقاومت هوا که به چتر باز وارد می شود برابر با (صفر - نیروی وزن) است.	۱/۲۵
۲	معادله سرعت - زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند، در SI به صورت $V = -10t + 20$ است. الف) در لحظه $t = 3s$ جهت بردارهای سرعت و شتاب متحرک را تعیین کنید. ب) در چه لحظه ای این متحرک تغییر جهت می دهد؟	۰/۵ ۰/۵
۳	شکل زیر نمودار مکان - زمان جسمی را که روی محور x حرکت می کند نشان می دهد. معادله حرکت متحرک را در بازه های زمانی صفر تا $20s$ و $20s$ تا $40s$ بنویسید. 	۱
۴	نمودار سرعت - زمان متحرکی که از مکان اولیه $20m$ - شروع به حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. با به دست آوردن مکان متحرک در لحظه های $t = 10s$ و $t = 20s$، نمودار مکان - زمان این متحرک را در بازه زمانی صفر تا $30s$ رسم کنید. 	۱/۵
	ادامه در صفحه دوم	

سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک ۳	رشته: علوم تجربی	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲	تعداد صفحه: ۴	نام و نام خانوادگی:	ساعت شروع: ۸ صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۲		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir	

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می باشد.

ردیف	سؤالات	نمره
۵	شخصی به جرم 60 kg درون آسانسور ساکنی روی ترازوی فنری ایستاده است. $(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$ الف) هرگاه آسانسور با شتاب رو به پایین $3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ حرکت کند، ترازو چه عددی را نشان می دهد؟ ب) اگر کابل آسانسور پاره شود و آسانسور سقوط آزاد کند، ترازو عدد صفر را نشان می دهد. دلیل آن را توضیح دهید.	۰/۷۵ ۰/۵
۶	شکل مقابل شخصی را نشان می دهد که بر جعبه 75 کیلوگرمی نیروی افقی F وارد می کند. الف) اگر جعبه در ابتدا ساکن باشد، حداقل نیروی لازم برای به حرکت در آوردن جعبه چقدر است؟ ضریب اصطکاک ایستایی بین جعبه و سطح 0.6 است. ب) اگر شخص جعبه را با نیروی $F = 500 \text{ N}$ به حرکت در آورد و ضریب اصطکاک جنبشی بین جعبه و سطح 0.5 باشد، تغییر تکانه آن را 2 ثانیه پس از شروع حرکت حساب کنید. $(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$	۰/۷۵ ۱
۷	فنری با ثابت k داریم؛ آزمایشی را توضیح دهید که بتوان با استفاده از وسایل زیر مقدار ثابت فنر را به دست آورد. وسایل آزمایش: فنر، وزنه با جرم معلوم، خط کش	۰/۷۵
۸	شکل زیر طرحی از شکست امواج سطحی در مرز آب عمیق و آب کم عمق در تشت موج را نشان می دهد. طول موج، تندی انتشار و عمق آب در دو محیط (۱) و (۲) را با هم مقایسه کنید.	۰/۷۵
۹	درستی یا نادرستی هر یک از گزاره های زیر را با واژه ((درست)) یا ((نادرست)) در پاسخ برگ مشخص کنید. الف) دوره تناوب آونگ ساده، با جذر طول آن رابطه مستقیم دارد. ب) اگر یک تاب را با بسامد بیشتر از بسامد طبیعی آن هل دهیم، دامنه نوسان بزرگتر از حالتی می شود که با بسامد طبیعی اش هل می دهیم. پ) در موج الکترومغناطیسی، میدان ها، همگام با یکدیگر و با بسامد متفاوت نوسان می کنند. ت) در نور مرئی ضریب شکست یک محیط معین برای طول موج های کوتاه تر، بیشتر است. ث) تندی انتشار صوت در محیط جامد بیشتر از مایع است.	۱/۲۵
	ادامه در صفحه سوم	

سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک ۳	رشته: علوم تجربی	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲	تعداد صفحه: ۴	نام و نام خانوادگی:	ساعت شروع: ۸ صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۲		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir	


توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می باشد.

ردیف	سؤالات	نمره
۱۰	به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (الف) در پدیده سراب جبهه‌های موج در لایه‌های بالا، تندی کمتری نسبت به لایه‌های پایین دارند. علت را توضیح دهید. (ب) اگر ناظر به چشمه صوت ساکن نزدیک شود، آیا طول موج کاهش می‌یابد؟	۰/۵ ۰/۲۵
۱۱	معادله حرکت هماهنگ ساده یک نوسانگر در SI به صورت $x = 0.02 \cos 2\pi t$ است. (الف) اندازه شتاب نوسانگر را در مکان $x = 0.01$ m محاسبه کنید. (ب) در چه لحظه‌ای برای اولین بار تندی نوسانگر بیشینه می‌شود؟	۰/۵ ۰/۵
۱۲	نمودار انرژی پتانسیل بر حسب مکان در یک سامانه جرم-فنر که جرم وزنه آن ۲۰۰ g است، مطابق شکل روبه روست. تندی وزنه را در مکان x به دست آورید.	۱
۱۳	با زیاد کردن صدای تلویزیونی، شدت صوتی که به گوش ما می‌رسد ۲ برابر می‌شود. تراز شدت صوتی که می‌شنویم چقدر و چگونه تغییر می‌کند؟ ($\log 2 = 0.3$)	۱
۱۴	مطابق شکل زیر، پرتو نور از شیشه وارد هوا شده است. اگر ضریب شکست هوا $n = 1$ باشد. (الف) ضریب شکست شیشه چقدر است؟ (ب) اگر بسامد نور در شیشه 4×10^{14} Hz باشد، بسامد آن در هوا چقدر است؟ $\sin 37^\circ = 0.6$ $\sin 53^\circ = 0.8$	۰/۵ ۰/۲۵
	ادامه در صفحه چهارم	

سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک ۳	رشته: علوم تجربی	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲	تعداد صفحه: ۴	نام و نام خانوادگی:	ساعت شروع: ۸ صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۲		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir	

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می باشد.

ردیف	سؤالات	نمره
------	--------	------

۱۵	در جدول زیر برای هر گزاره از ستون (۱)، گزینه مناسب از ستون (۲) را انتخاب کرده و در پاسخ برگ بنویسید.					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ستون (۱)</th> <th>ستون (۲)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> (۱) در واپاشی بتای مثبت یکی از پروتون ها به یک نوترون و یک تبدیل می شود. (۲) هسته ها که در حالت برانگیخته قرار می گیرند با گسیل این پرتو به حالت پایه می رسند. (۳) در پرتو زایی، این نوع پرتو کمترین قدرت نفوذ را دارد. (۴) تفاوت ایزوتوپ های یک عنصر در تعداد می باشد. </td> <td> الف) آلفا ب) پوزیترون پ) الکترون ها ت) نوترون ها ث) گاما </td> </tr> </tbody> </table>	ستون (۱)	ستون (۲)	(۱) در واپاشی بتای مثبت یکی از پروتون ها به یک نوترون و یک تبدیل می شود. (۲) هسته ها که در حالت برانگیخته قرار می گیرند با گسیل این پرتو به حالت پایه می رسند. (۳) در پرتو زایی، این نوع پرتو کمترین قدرت نفوذ را دارد. (۴) تفاوت ایزوتوپ های یک عنصر در تعداد می باشد.	الف) آلفا ب) پوزیترون پ) الکترون ها ت) نوترون ها ث) گاما	۱
ستون (۱)	ستون (۲)					
(۱) در واپاشی بتای مثبت یکی از پروتون ها به یک نوترون و یک تبدیل می شود. (۲) هسته ها که در حالت برانگیخته قرار می گیرند با گسیل این پرتو به حالت پایه می رسند. (۳) در پرتو زایی، این نوع پرتو کمترین قدرت نفوذ را دارد. (۴) تفاوت ایزوتوپ های یک عنصر در تعداد می باشد.	الف) آلفا ب) پوزیترون پ) الکترون ها ت) نوترون ها ث) گاما					
۱۶	الف) در آزمایش شکل مقابل (فوتوالکتریک) فاصله صفحات برق نما تغییر پیدا نمی کند. علت را توضیح دهید. ب) دو ویژگی گسیل القایی را بنویسید.	 لامپ رشته ای معمولی	۰/۵ ۰/۵			
۱۷	اگر الکترون در اتم هیدروژن از دومین حالت برانگیخته به حالت پایه برسد، طول موج فوتون گسیلی چقدر است؟ ($hc = 1240 \text{ eV.nm}$)	۱				
	0 eV _____ $-1/51 \text{ eV}$ _____ $-3/4 \text{ eV}$ _____ $-13/6 \text{ eV}$ _____					
۱۸	بلندترین و کوتاه ترین طول موج های رشته بالمر ($n=2$) هیدروژن اتمی را به دست آورید. $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$	۱/۲۵				
۱۹	اگر نیمه عمر یک عنصر پرتوزا سه روز باشد، پس از گذشت چند روز $\frac{3}{4}$ هسته های عنصر واپاشیده شده است؟	۰/۷۵				
۲۰	شاد و پیروز باشید					

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس فیزیک ۳		رشته علوم تجربی	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲	تعداد صفحات: ۲	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خردادماه سال ۱۴۰۲			
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir			
ردیف	پاسخ‌ها	بارم	
۱	الف) تغییر سرعت (ص ۵ ب) تندی متوسط (ص ۳ پ) سرعت (ص ۲۹ ت) برابر (ص ۴۶ ث) نیروی وزن (ص ۳۵) (هر مورد صحیح ۰/۲۵)	۱/۲۵	
۲	الف) $a = -10 \frac{m}{s^2}$ خلاف جهت محور x (۰/۲۵) $v = -10 \frac{m}{s}$ خلاف جهت محور x (۰/۲۵) ب) $t = 2s$ (۰/۲۵) $v = -10t + 20$ (۰/۲۵) $0 = -10t + 20$ (۰/۲۵) ص ۱۶	۱	
۳	الف) $x = 20m$ (۰/۲۵) $x = 0.5t + 10$ (۰/۵) $x = vt + x_0$ (۰/۲۵) ص ۱۴	۱	
۴	رسم درست نمودار: در ۱۰s اول (۰/۲۵)، در ۱۰s دوم (۰/۲۵) و در ۱۰s سوم (۰/۲۵) $x_r - x_l = \left(\frac{v_1 + v_r}{2} \right) \Delta t$ (۰/۲۵) $x(20s) = 180m$ (۰/۲۵) و $x(10s) = 80m$ (۰/۲۵) ص ۱۹	۱/۵	
۵	الف) $F_N = 420N$ (۰/۲۵) $F_N = 60(10 - 3)$ (۰/۲۵) $F_N = m(g - a)$ (۰/۲۵) ب) در سقوط آزاد $a = g$ (۰/۲۵) در نتیجه $F_N = m(g - a) = m(g - g) = 0$ (۰/۲۵) ص ۳۶	۱/۲۵	
۶	الف) $F = f_{smax} = 450N$ (۰/۲۵) $f_{smax} = 0.6 \times 750$ (۰/۲۵) $f_{smax} = \mu_s F_N$ (۰/۲۵) ب) $F_{net} = 500 - (0.5 \times 75 \times 10) = 125N$ (۰/۲۵) $F_{net} = F - f_k = F - \mu_k mg$ (۰/۲۵) $\Delta p = F_{net} \Delta t$ (۰/۲۵) $\Delta p = 125 \times 2 = 250 \frac{kg \cdot m}{s}$ (۰/۲۵) ص ۴۵ و ۴۰	۱/۷۵	
۷	فنر را از نقطه‌ای آویزان می‌کنیم و طول اولیه آن را اندازه می‌گیریم (L_1). (۰/۲۵) وزنه را به فنر آویزان کرده و در شرایط تعادل دوباره طول فنر را اندازه گیری می‌کنیم (L_2). (۰/۲۵) با استفاده از رابطه زیر مقدار k را به دست می‌آوریم. $k = \frac{mg}{L_2 - L_1}$ (۰/۲۵) ص ۸۹	۰/۷۵	
۸	طول موج و تندی در محیط ۱ بیشتر از محیط ۲ است. (۰/۵) محیط ۱ عمیق‌تر از محیط ۲ است. (۰/۲۵). ص ۸۲	۰/۷۵	
۹	الف) درست ب) نادرست پ) نادرست ت) درست ث) درست (هر مورد صحیح ۰/۲۵) ص ۵۹ و ۶۰ و ۶۷ و ۸۷ و ۷۱	۱/۲۵	

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		رشته علوم تجربی		راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس فیزیک ۳	
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه		تعداد صفحات: ۲		تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲	
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خردادماه سال ۱۴۰۲			
۰/۷۵	الف) در لایه های بالاتر، هوا کمی سردتر است، در نتیجه تندی حرکت جبهه ها کمتر است. (۰/۵) ب) خیر (۰/۲۵)	ص ۸۷ ص ۷۶			
۱	الف) $a = \omega^2 x$ (۰/۲۵) $a = (2\pi)^2 (0/01)$ $a = 4\pi^2 \frac{m}{s^2}$ (۰/۲۵) ب) $t = \frac{T}{4}$ (۰/۲۵) $t = \frac{0/1}{4} = \frac{1}{40} s$ (۰/۲۵)	ص ۸۹			
۱	$E = K + U$ (۰/۲۵) $60 = 20 + K$ $K = 40 J$ (۰/۲۵) $K = \frac{1}{2}mv^2$ (۰/۲۵) $40 = \frac{1}{2} \times 0/2 v^2$ $v^2 = 400$ $v = 20 \frac{m}{s}$ (۰/۲۵)	ص ۵۸			
۱	$\Delta\beta = 10 \log \frac{I_2}{I_1}$ (۰/۲۵) $\Delta\beta = 10 \log 2$ (۰/۲۵) $\Delta\beta = 10 \times 0/3 = 3 db$ (۰/۲۵) افزایش (۰/۲۵)	ص ۷۳			
۰/۷۵	$\frac{\sin 53}{\sin 37} = \frac{n_2}{n_1}$ (۰/۲۵) $\frac{0/8}{0/6} = \frac{n_2}{1}$ $n_2 = \frac{4}{3}$ (۰/۲۵) $4 \times 10^{14} Hz$ (۰/۲۵)	ص ۹۳ و ۸۵			
۱	الف) چون بسامد نور تابیده شده کمتر از بسامد آستانه است. (۰/۵) ب) ۱) یک فوتون وارد و دو فوتون خارج می شود (۰/۲۵) ۲) فوتون گسیل شده در همان جهت فوتون ورودی است (۰/۲۵)	ص ۱۱۳ و ۱۱۶ و ۱۱۹ و ۱۱۸			
۱	$E_3 - E_1 = \frac{hc}{\lambda}$ (۰/۲۵) $-1/5 - (-13/6) = \frac{1240}{\lambda}$ (۰/۵) $\lambda = 102/47 nm$ (۰/۲۵)	ص ۱۰۶			
۱/۲۵	$\frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2})$ (۰/۲۵) $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{100}(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{\infty^2})$ (۰/۲۵) $\lambda = 400 nm$ (۰/۲۵) $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{100}(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2})$ (۰/۲۵) $\lambda = \frac{3600}{5} = 720 nm$ (۰/۲۵)	ص ۱۰۷			
۰/۷۵	$\frac{N_0}{4} = \frac{N_0}{2^n}$ (۰/۲۵) $2^n = 2^2$ $n = 2$ $n = \frac{t}{T_{\frac{1}{2}}}$ (۰/۲۵) $2 = \frac{t}{3}$ $t = 6 \text{ روز}$ (۰/۲۵)	ص ۱۲۱			
۲۰	مصححین گرامی، برای پاسخ های صحیح دیگر نیز نمره لازم در نظر گرفته شود. جمع نمرات				