

۳ هدیه
رایگان

کتاب ۱۰ جهش

دوره تندخوانی

سه بعد موفقیت در کنکور

۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴

کاملاً رایگان
از ما هدیه
بگیرید.

۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴



مهدی براتی

نویسنده کتاب ۱۰ جهش طلایی تارته ۱۰۰
۱۸ سال تجربه تخصصی مشاوره تحصیلی
سرگروه توسعه شایستگی استان خوزستان
مشاور صدها رتبه برتر در کنکور

برای دریافت کلمه ۱۰ جهش را پیامک کنید

کانال تلگرام و شاد: mehdibaratimoshaver

مهدی براتی معمار ذهن رتبه ساز ۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴

۳ هدیه بی نظیر را به صورت کاملاً

رایگان از ما بگیرید.

چاپ دوم

۱۰ جهش طلایی

تا رتبه ۱۰۰

خودآموز برنامه ریزی در یک ساعت
انتخاب های سرنوشت ساز
مطالعه صحیح، هنر است
کمتر بخوانید، بیشتر تست بزنید
خدا حافظی با فراموشی
همیشه با انگیزه باشید
شبانه روز ۲۸ ساعت است!
چگونه تند خوان شوید
راز داشتن ذهن قدرتمند و بدون دغدغه
تمرکز بودا، حافظه اینشتین

مهدی براتی

به همراه
۱۹۹ هزار تومان
هدیه

۱- کتاب ۱۰ جهش طلایی تا رتبه ۱۰۰

توجه: کاملاً رایگان

۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴

www.moshaversubz.com

تند خوانی ویژه کنکور

چگونه در سال کنکور در سریع ترین زمان تندخوان شویم؟

مدرس: مهدی براتی
ویژه ی دانش آموزان
دانشجویان و مشاوران

۳- دوره تندخوانی ویژه کنکور

دوره ۳ بعد موفقیت در کنکور

- ✓ اصول مطالعه
(روش مطالعه و بودجه بندی و اهمیت هر درس ۱۳ قسمت)
- ✓ مهارت های مطالعه
(اصول تست زنی، آزمون دادن، خلاصه نویسی و ... ۱۴ قسمت)
- ✓ روانشناسی مطالعه
(مدیریت ذهن، کنترل استرس، تبیلی، افزایش عزت نفس و خودشناسی و ... ۲۶ قسمت)

مدرس: مهدی براتی
مؤلف، دانش آموزان



۲- سه بعد موفقیت در کنکور

به کانال ما در شاد و یا تلگرام بپیوندید .

[@mehdibaratimoshaver](https://t.me/mehdibaratimoshaver)

مرجع دانلود سوالات مفهومی ویژه نمره ۲۰ نهایی از سرگروه های درسی

۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴

سؤالات آزمون نهایی درس: فیزیک ۳		تعداد صفحه: ۳	رشته:	ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۸:۰۰ صبح
دوازدهم		تاریخ آزمون:	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایتارگر داخل و خارج کشور تابستان ۱۴۰۳		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir			
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.				
۱	کلمه صحیح را از داخل پرانتز انتخاب و به پاسخ برگ منتقل کنید. الف) برای شناگری که طول یک استخر را شنا می‌کند و به نقطه شروع بر می‌گردد، کمیت (مسافت - جابه جایی) صفر است. ب) شیب خط مماس بر نمودار سرعت - زمان در هر لحظه، برابر شتاب (متوسط - لحظه‌ای) در آن لحظه است. پ) تندی متوسط کمیتی (بردازی - نرده ای) است. ت) در حرکت با (سرعت - شتاب) ثابت، سرعت متوسط متحرک در هر بازه زمانی دلخواه، برابر سرعت لحظه‌ای آن است.				
۰.۷۵	نمودار سرعت - زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل روبه‌رو است.  الف) در کدام بازه زمانی، حرکت متحرک در جهت محور x و کندشونده است؟ ب) در کدام لحظه، متحرک تغییر جهت می‌دهد؟ پ) در بازه زمانی t_1 تا t_3 اندازه شتاب در حال کاهش است یا افزایش؟				
۱.۲۵	متحرکی در امتداد محور x و با شتاب ثابت در حرکت است. اگر سرعت متحرک در مکان $x = -1\text{ m}$ برابر 6 m/s و در مکان $x = 7\text{ m}$ برابر 10 m/s باشد، الف) شتاب حرکت آن چند متر بر مربع ثانیه است؟ ب) پس از چه مدتی سرعت متحرک از 6 m/s به 10 m/s می‌رسد؟				
۰.۷۵	در شرایط خلأ، سنگی از بالای صخره‌ای رها می‌شود و 4 s پس از سقوط به زمین می‌رسد. ارتفاع صخره چند متر است؟ ($g = 10\text{ m/s}^2$)				
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارات‌های زیر را مشخص و به پاسخ برگ منتقل کنید. الف) نیروهای متوازن، الزاماً بر یک جسم وارد می‌شوند. ب) هر چه یک گوی فلزی با تندی بیش‌تر درون یک شاره حرکت کند، اندازه نیروی مقاومت شاره کم‌تر می‌شود. پ) جرم یک جسم در سطح ماه و سطح مریخ متفاوت است. ت) با پاره شدن کابل آسانسور در حال حرکت، شتاب آن بیش‌تر از شتاب گرانشی می‌شود.				
۱.۵	مطابق شکل زیر جسمی به جرم 6 kg توسط فنری که ثابت آن 80 N/m است، با سرعت ثابت روی سطح افقی کشیده می‌شود. اگر در این حالت تغییر طول فنر 10 cm باشد، نیرویی که سطح به جسم وارد می‌کند چند نیوتون است؟ ($g = 10\text{ m/s}^2$) 				
۰.۷۵	توبی به جرم 200 g با تندی 12 m/s به طور افقی به بازیکنی نزدیک می‌شود. بازیکن با مشت به توپ ضربه می‌زند و باعث می‌شود توپ با تندی 18 m/s در جهت مخالف برگردد. اندازه تغییر تکانه توپ چند کیلوگرم در متر بر ثانیه است؟				

سؤالات آزمون نهایی درس: فیزیک ۳		تعداد صفحه: ۳	رشته:	ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۸:۰۰ صبح
دوازدهم	تاریخ آزمون:	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایتارگر داخل و خارج کشور تابستان ۱۴۰۳					
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir					
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.				
۸	سورتمه‌ای روی سطح افقی در پیچی به شعاع 25m در حال حرکت است. اگر اندازه شتاب مرکزگرای آن 49m/s^2 باشد، تندی حرکت سورتمه چند متر بر ثانیه است؟				
۹	به سوال‌های زیر پاسخ کوتاه دهید. (الف) با کاهش جرم در سامانه جرم- فنر (با فنر یکسان) دوره تناوب نوسان‌ها چه تغییری می‌کند؟ (ب) پدیده‌ای که در آن بسامد طبیعی نوسانگر با بسامد نوسان‌های واداشته آن یکسان است چه نام دارد؟ (پ) شدتی که گوش انسان از صوت درک می‌کند چه نام دارد؟ (ت) آمبولانسی آذیرکشان به شخص ساکنی نزدیک می‌شود. بسامد دریافتی شخص نسبت به وضعیتی که آمبولانس ساکن بوده است، چه تغییری می‌کند؟				
۱۰	شکل روبه‌رو یک موج سینوسی را در لحظه‌ای از زمان نشان می‌دهد که در طول ریسمان کشیده شده‌ای حرکت می‌کند. اگر در لحظه نشان داده شده، ذره a رو به پایین حرکت کند، (الف) جهت انتشار موج را تعیین کنید. (ب) اگر بسامد نوسان 20Hz باشد، تندی انتشار موج چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟				
۱۱	با استفاده از وسیله‌های زیر، روشی برای اندازه‌گیری تندی صوت در هوا بنویسید. (میکروفون، زمان سنج حساس، چکش و صفحه فلزی)				
۱۲	معادله حرکت هماهنگ ساده یک نوسانگر در SI به صورت $x = 0.5 \cos 8\pi t$ است. (الف) دامنه نوسان چند متر است؟ (ب) اگر جرم نوسانگر 100g باشد، انرژی مکانیکی نوسانگر چند ژول است؟ ($\pi^2 = 10$)				
۱۳	با استفاده از جعبه کلمات داده شده، جاهای خالی را در جمله‌های زیر کامل کنید. (دو کلمه اضافی است). تداخل - افزایش - کاهش - طول موج - پژواک - پراش - بسامد (الف) ضریب شکست هوا با افزایش دما می‌یابد. (ب) اساس کار اجاق‌های میکروموج (مایکروفر) امواج است. (پ) در آزمایش یانگ، پهنای هر نوار تاریک یا روشن با نور به کار رفته، متناسب است. (ت) اگر موج سینوسی از قسمت ضخیم طناب به قسمت نازک آن وارد شود، تندی آن می‌یابد. (ث) اگر صوت پس از بازتاب، با یک تأخیر زمانی به گوش شنونده‌ای برسد که صوت اولیه را مستقیماً می‌شنود، به چنین بازتابی می‌گویند.				

به نام خدا					
سؤالات آزمون نهایی درس: فیزیک ۳		تعداد صفحه: ۳	رشته:	ریاضی و فیزیک	
دوازدهم		تاریخ آزمون:	نام و نام خانوادگی:		مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایتارگر داخل و خارج کشور تابستان ۱۴۰۳		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir			
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.				
۱۴	۱.۲۵	تار ویولنی در مد (هماهنگ) $n=2$ خود نوسان می‌کند. اگر طول تار 20 cm و تندی موج عرضی در این تار 250 m/s باشد: (الف) بسامد موج گسیل شده چند هرتز است؟ (ب) با رسم شکل موج ایستاده، تعداد شکم‌ها را مشخص کنید.			
۱۵	۰.۷۵	پرتو نوری از هوا وارد مایعی می‌شود. اگر تندی نور در مایع $2/25 \times 10^8\text{ m/s}$ باشد، ضریب شکست مایع را به دست آورید. ($c = 3 \times 10^8\text{ m/s}$)			
۱۶	۱	هر یک از موارد ستون اول به کدام مورد در ستون دوم مرتبط است؟ آن‌ها را به پاسخ برگ منتقل کنید. (دو مورد در ستون دوم اضافی است).			
		ستون اول		ستون دوم	
		(الف) در دماهای معمولی، بیش‌تر تابش گسیل شده از اجسام در این ناحیه واقع است. (ب) رشته لیمان در این ناحیه طیف الکترومغناطیسی قرار دارد. (پ) در این نوع گسیل، یک فوتون وارد و دو فوتون خارج می‌شود. (ت) مدارها و انرژی‌های الکترون‌ها در هر اتم، کوانتیده اند.			
۱۷	۰.۷۵	هرگاه بر سطح فلزی نوری با طول موج 400 nm بتابد بیشینه انرژی جنبشی فوتوالکترون‌های گسیل شده 0.5 eV می‌شود. تابع کار فلز چند الکترون ولت است؟ ($hc = 1200\text{ eV.nm}$)			
۱۸	۱	(الف) علت وجود خطوط تاریک در طیف خورشید چیست؟ (ب) کوتاه ترین طول موج در رشته براکت ($n'=4$) هیدروژن اتمی را به دست آورید. ($R = 0.01\text{ (nm)}^{-1}$)			
۱۹	۱.۲۵	(الف) انرژی بستگی هسته را تعریف کنید. (ب) $^{242}_{94}\text{Pu}$ واپاشی α (آلفا) انجام می‌دهد. معادله واپاشی را نوشته و هسته دختر را به صورت ^A_ZX مشخص کنید. (پ) نیرویی که نوکلئون‌ها را در هسته کنار یکدیگر نگه می‌دارد چه نام دارد؟ (ت) فرایند تقسیم شدن یک هسته سنگین به دو هسته با جرم کم‌تر چه نام دارد؟			
۲۰	۰.۷۵	پس از گذشت ۳۰ ساعت تعداد هسته‌های پرتوزای یک نمونه به $\frac{1}{64}$ تعداد موجود در آغاز کاهش یافته است. نیمه عمر این نمونه چند ساعت است؟ موفق و سربلند باشید.			

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: فیزیک ۳		رشته: ریاضی و فیزیک	
دوازدهم		تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۰۵/۱۸	
مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه		ساعت شروع: ۸:۰۰ صبح	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و اینترگر داخل و خارج کشور تابستان ۱۴۰۳		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir	
ردیف	راهنمای تصحیح		
نمره			
۱	الف) جابجایی	ب) لحظه‌ای	پ) نرده‌ای
۱	هر مورد (۰/۲۵) ص ۱۳، ۱۱، ۳، ۲		
۲	الف) t_1 تا t_2 (۰/۲۵)	ب) t_2 (۰/۲۵)	پ) افزایش (۰/۲۵)
۰.۷۵	ص ۱۹، ۱۱		
۳	الف) $a = 4 \text{ m/s}^2$ (۰/۲۵)	ب) $t = 1 \text{ s}$ (۰/۲۵)	پ) $10 = 4t + 6$
۱.۲۵	ت) $v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$ (۰/۲۵) ص ۲۸		
۴	الف) $y = -8.0 \text{ m}$ (۰/۲۵)	ب) $ y = 8.0 \text{ m}$ یا	پ) $y = -\frac{1}{2} \times 10 \times 16 + 0$ (۰/۲۵)
۰.۷۵	ت) $y = -\frac{1}{2}gt^2 + y_0$ (۰/۲۵) ص ۲۳		
۵	الف) درست	ب) نادرست	پ) نادرست
۱	ت) نادرست هر مورد (۰/۲۵) ص ۳۹، ۳۶، ۳۶، ۳۰		
۶	الف) $F_e = f_k$ (۰/۲۵)	ب) $f_k = k\Delta x$ (۰/۲۵)	پ) $f_k = 8.0 \times 0.1 = 8 \text{ N}$ (۰/۲۵)
۱.۵	ت) $F_N = mg = 0.6 \times 10 = 6 \text{ N}$ (۰/۲۵) ص ۴۳، ۴۲		
۷	الف) $ \Delta p = 6 \text{ kg.m/s}$ (۰/۲۵)	ب) $ \Delta p = 0.2(-18 - 12)$ (۰/۲۵)	پ) $ \Delta p = m\Delta v$ (۰/۲۵)
۰.۷۵	ص ۵۹		
۸	الف) $a_c = \frac{v^2}{r}$ (۰/۲۵)	ب) $49 = \frac{v^2}{25}$ (۰/۲۵)	پ) $v = 35 \text{ m/s}$ (۰/۲۵)
۰.۷۵	ص ۵۲		
۹	الف) کاهش	ب) تشدید	پ) بلندی
۱	ت) افزایش هر مورد (۰/۲۵) ص ۸۲، ۸۱، ۷۷، ۶۵		
۱۰	الف) خلاف محور x (به طرف چپ) (۰/۲۵)	ب) $v = 8 \times 20 = 160 \text{ cm/s}$ (۰/۲۵)	پ) $\lambda = \frac{v}{f}$ (۰/۲۵)
۱	ت) $\lambda = 8 \text{ cm}$ (۰/۲۵) ص ۷۱، ۸۶		
۱۱	دو میکروفون را مطابق شکل زیر به یک زمان سنج حساس متصل می‌کنیم. با ضربه زدن چکش به صفحه فلزی، امواج صوتی به سمت دو میکروفون روانه می‌شود. (۰/۲۵) اختلاف فاصله میکروفون‌ها از محل برخورد چکش با صفحه، را اندازه می‌گیریم و با زمان سنج تاخیر زمانی بین دو دریافت صوت را ثبت می‌کنیم. (۰/۲۵) سپس از رابطه $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ (۰/۲۵) تندی صوت در هوا را محاسبه می‌کنیم. (۰/۲۵) ص ۷۹		

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: فیزیک ۳		رشته: ریاضی و فیزیک	
دوازدهم		تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۰۵/۱۸	ساعت شروع: ۸:۰۰ صبح
		مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir
ردیف	راهنمای تصحیح		
نمره			
۱۲	الف) 0.5 m (۰/۲۵) ب) $E = 0.8\text{ J}$ (۰/۲۵) $E = \frac{1}{2} \times 0.1 \times 25 \times 10^{-6} \times 64 \pi^2$ (۰/۲۵) $E = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2$ (۰/۲۵) ص ۶۶، ۶۳	۱	
۱۳	الف) کاهش ب) تداخل پ) طول موج ت) افزایش ث) پژواک هر مورد (۰/۲۵) ص ۱۱۰، ۱۰۵، ۹۹، ۹۵، ۹۲	۱.۲۵	
۱۴	الف) $f = 1250\text{ Hz}$ (۰/۲۵) ب) رسم شکل (۰/۲۵) تعداد شکم برابر ۲ (۰/۲۵) $f_n = \frac{nv}{2L}$ (۰/۲۵) $f = \frac{2 \times 250}{2 \times 0.2}$ (۰/۲۵) ص ۱۰۷	۱.۲۵	
۱۵	$n = \frac{4}{3}$ (۰/۲۵) $n = \frac{3 \times 10^8}{2/25 \times 10^8}$ (۰/۲۵) $n = \frac{c}{v}$ (۰/۲۵) ص ۹۷	۰.۷۵	
۱۶	الف) فروسرخ (۳) ب) فرابنفش (۶) پ) گسیل القایی (۴) ت) مدل بور (۱) هر مورد (۰/۲۵) ص ۱۳۲، ۱۲۷، ۱۲۳، ۱۲۱	۱	
۱۷	$W_0 = 2/5\text{ eV}$ (۰/۲۵) $0.5 = \frac{1200}{400} - W_0$ (۰/۲۵) $k_{\max} = \frac{hc}{\lambda} - W_0$ (۰/۲۵) ص ۱۱۸	۰.۷۵	
۱۸	الف) جذب طول موج های نور تابشی خورشید (۰/۲۵) ب) $\lambda = 1600\text{ nm}$ (۰/۲۵) $\frac{1}{\lambda} = 0.1 \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{\infty} \right)$ (۰/۲۵) $\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$ (۰/۲۵) ص ۱۲۹، ۱۲۴	۱	
۱۹	الف) انرژی لازم برای جدا کردن نوکلئون های یک هسته، انرژی بستگی هسته ای نامیده می شود. (۰/۵) ب) $z = 92$ (۰/۲۵) $94 = z + 2$ $A = 238$ (۰/۲۵) $242 = A + 4$ ${}_{94}^{242}\text{Pu} \rightarrow {}_Z^AX + {}_2^4\text{He}$ (۰/۲۵) پ) نیروی هسته ای (۰/۲۵) ت) شکافت هسته ای (۰/۲۵) ص ۱۵۵، ۱۴۸، ۱۴۱، ۱۴۰	۱.۷۵	
۲۰	$T_{\frac{1}{2}} = \frac{t}{n} = \frac{30}{6} = 5\text{ h}$ (۰/۲۵) $n = 6$ (۰/۲۵) $\frac{1}{64} N_0 = \frac{N_0}{2^n}$ $N = \frac{N_0}{2^n}$ (۰/۲۵) ص ۱۴۷	۰.۷۵	